Monsieur.

Instruit trop tard que vous recueillez des renseignemens sur ces
têtes volumineuses regardées jusqu'à present comme des têtes ~~hydro~~
hydrocéphales; j'avois perdu de vue un des enfans dont j'ai eu l'honneur
de vous parler; j'avois même oublié le nom de la paroisse ou il existoit.
il m'a fallu du tems pour m'instruire et j'ai su depuis quelques jours
seulement que cet enfant né à la Gravelle, Bourg à quatre lieues de cette
ville sur la Route de Bretagne y est mort depuis quatre à cinq
semaines agé d'environ 10 Mois. voici ce que j'ai pu recueillir à son
sujet.

La mere de cet enfant, femme d'un Tailleur d'habits, avoit une grossesse
laborieuse et son accouchement fut difficile; je n'ai pu savoir pourquoi;
L'enfant né parut sain et la tête etoit conformée à l'ordinaire. quelque
tems après on lui apperçut au dessus des oreilles une tumeur qui prit
de l'accroissement en s'étendant vers l'occipital et elle est venue au point
que la tête a eu une demie aune de circonference à peu près mais de
manière que le front et les regions temporales etoient plus saillantes que
L'occipitale applatie par la position presque constante de l'enfant sur le
Dos. la tête paroissoit partout d'une egale molesse mais sans fluctuation
sensible et on pouvoit la comprimer dans tous les sens. cet enfant n'a
point pris le teton il a été ~~elev~~ Nourri avec de la Bouillie et
l'eau Bouillie sur les restes de cette mauvaise nourriture. des cris
presque continuels annonçoient que cet enfant souffroit. s'il cessoit de
crier il dormoit d'un someil très naturel. il etoit d'un tel appetit qu'à
4 à 5 Mois il mangeoit chaque jour une pinte et demie de lait et

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

en Bouillie. il etoit constamment constipé du reste il paroissoit bien faire toutes ses fonctions, il se developpoit, croissoit et avoit de la force comme un enfant de son age. il est mort d'une coqueluche qui a duré six semaines. cette maladie lui avoit oté l'appetit, il ne mangeoit pas la sixieme partie de ce qu'il mangeoit auparavant. la veille de sa mort il parut ~~fort bien et~~ mieux il mangea fort bien. instruit à tems de la mort de cet enfant j'aurois pu vous donner, Monsieur, quelques details sur l'état du cerveau et de ses enveloppes.

J'ai mis au monde il y a environ 12 ans un enfant a peu près à terme dont la tête étoit très volumineuse. cette tête, extrêmement molle, parceque l'enfant étoit mort au sein de sa mère, étoit pleine de serosité le cerveau avoit peu de volume.

J'avois eu l'honneur de vous demander votre avis Monsieur, sur l'hydrocéle enkistée d'un enfant de 9 ans ou environ, fils cheri d'un de mes amis. je disois que la ponction et des topiques l'ayant dissipée pendant un an, elle avoit reparu et je vous priois de me dire votre opinion sur la methode à mettre en usage pour la guerir radicalement. Si vous pouvez Monsieur, prendre le tems de me donner votre avis que les parens desirent vous m'obligerez infiniment.

Je dois encore Monsieur, puisque j'en ai l'occasion vous faire part d'un cas que je crois assez rare puisque je l'ai encore lu nulle part. Je veux parler de la luxation de la tête du radius. Voici le fait

Le 6 juin dernier je fus appellé l'après diné pour voir le fils de Mr. Turcau Md. de Port. cet enfant agé de 8 a 9 ans etoit, depuis une demie heure tombé de cheval sur le pavé et on lui croyoit le bras cassé. Je trouvai cet enfant assis sur une chaise, la main en pronation et le poignet posés sur la cuisse l'avant bras legerement flechi et son articulation avec le bras deja très gonflée mais cependant de façon qu'on distinguoit à l'œil sur le bord radial la tête du radius deplacée et fort saillante.

Jgnorant alors qu'il eut existé de luxation de cette partie du Radius sans la luxation du Cubitus et n'ayant point encore pensé qu'elle fut possible Je jugeai d'abord qu'il y avoit ce qu'on appelle une luxation laterale externe, alors incomplette du Cubitus et complette du Radius. le toucher m'en fit juger autrement. ~~et~~ ce ne fut pas sans surprise que je trouvai l'olecrane à sa place et la tête du Radius très saillante exterieurement. on pouvoit, sans ~~beaucoup~~ occasionner de douleur, faire executer des mouvemens de flexion et d'extension, mais les tentatives pour ramener la main en supination etoient accompagnée de beaucoup de douleur.

La reduction de cette Luxation fut très facile. un aide chargé de la Contre extension appuyoit de la paume d'une main sur la partie superieure et anterieure du Bras de l'autre sur la partie posterieure et inferieure pour agissant en sens Contraire tenir ferme L'humerus. Comme l'extension ne devoit pas être Considerable, Je saisis de la main droite, la luxation etoit au radius gauche, le poignet et la partie posterieure de L'avant bras. Je portai la paume de la main gauche les doigts etendus sur la face anterieure de l'avant Bras. Je fis agir ces deux mains de maniere à etendre et allonger les Muscles de la partie posterieure à deprimer ceux de la partie anterieure, ~~en~~ faisant flechir l'avant bras et ramenant la main en supination la tête du Radius ~~rentra~~ se rendit à sa place doucement et avec beaucoup de facilité.

Cette maniere de faire l'extension et la Contre extension est Comme le dit Mr. Theden à qui elle appartient, applicable à toutes les especes de Luxations de L'avant bras sur le bras, et je peux assurer qu'elle rend leur reduction extremement aisée.

Je ne dirai pas Comment s'est faite cette Luxation du Radius la connoissance de la maniere dont L'avant bras a porté dans la chute sur un pavé très inégal m'auroit aidé à en rendre Compte. L'examen

attentif de L'articulation de l'avant bras avec le Bras permet de Croire que cette Luxation du Radius ne Seroit pas aussi Rare si les Causes qui l'occasionnent pouvoient Souvent avoir leur effet

J'ai L'honneur d'être tres Respectueusement

Monsieur.

Votre tres humble et tres Obeissant Serviteur Legretain

Laval Le 22 fevr 1786.